

Hudklinikken Banegårdspladsen

Patientvejledning- Hudbiopsi

Formål:

Biopsi betyder vævsprøve. Hudbiopsier benyttes som hjælp til at stille en diagnose. Vævsprøven sendes til et laboratorium, hvor den efter passende behandling bliver skåret i meget tynde skiver, der bliver farvet og mikroskopert.

Udførelse:

Efter afvask med spritserviet foretages injektion af lokalbedøvelse. Bedøvelsen indsprøjtes under og omkring det element, der skal fjernes med en meget tynd kanyle. Området vil være bedøvet næsten umiddelbart efter indsprøjtningen. Udover stiksmerten vil der være en sviende smerte under indsprøjtningen af bedøvelsesvæsken.

Herefter stanses (bores) biopsien ud med en såkaldt stanser, som er et lille skarpt rør (2-4 mm i diameter). Biopsien klippes herefter af med en saks.

I nogle tilfælde vil man anvende en saks til at klippe biopsien ud af huden i stedet for en stanser.

Biopsistedet dækkes med et plaster, som fjernes efter et døgn. Nogle gange vil man vælge et såkaldt sommerfugleplaster, som skal sidde indtil det selv falder af.

I nogle tilfælde er det nødvendigt at sy biopsistedet sammen med et sting, som skal fjernes efter 5-10 dage.

Efter operationen

Der vil meget sjældent være smerter efterfølgende blot en let ømhed.

Det er vigtigt at biopsistedet vaskes med almindelig vand og sæbe hver dag.

Hvis der skulle opstå hævelse, rødme eller udtalt ømhed omkring såret kontaktes Klinikken/egen læge.

Hvis biopsistedet er syet sammen vil såret blive dække med et vandtæt plaster, idet det ikke må blive vådt før tråden er fjernet.

Ar

Alle operationer i huden selv fjernelse af små elementer vil kunne medføre en vis ardannelse.

Da hudbiopsier er meget små, vil arret også blive meget lille, og i nogle tilfælde knapt synlig med tiden.

Man vil opnå det bedste kosmetiske resultat, hvis arret beskyttes imod stærk sol den første sommer efter operationen