

- Hudlægerne Panoptikonbygningen

Banegårdsplads 1, 5 - 1570 København V - tlf.:33 12 22 20 - Ydernr.:

Oxybutynin (Ditropan)

Oxybutynin (Ditropan) er en tabletbehandling, der i nogle tilfælde kan behandle kraftig svedtendens (Hyperhidrose).

Oxybutynin (Ditropan) er en tabletbehandling, som blandt andet hæmmer svedtendens. Nogle patienter med kraftig svedtendens (Hyperhidrose) kan behandles med Oxybutynin (Ditropan).

Behandling: Oxybutynin (Ditropan) skal ordineres af en hudlæge. Hudlægen kan søge enkelttilskud.

Dosis Det anbefales, at du tager lavest mulige dosis. Som udgangspunkt anbefales:

- Uge 1: 1/2 tablet (2,5 mg) til natten
- Uge 3: 1/2 tablet (2,5 mg) morgen og 1/2 tablet (2,5 mg) til natten (i alt 5 mg)
- Uge 5: 1 tablet (5 mg) morgen og 1/2 tablet (2,5 mg) til natten (i alt 7,5 mg)
- Uge 7: 1 tablet morgen og 1 tablet til natten (i alt 10 mg)

Der er ofte tilfredsstillende effekt ved en lavere dosis. Tabletterne bør indtages 1 time før eller 2 timer efter et måltid sammen med et glas vand. Fødevarer med højt fedtindhold bør undgås. Du skal tage den dosis, du har aftalt med hudlægen.

Hvor hurtigt virker behandlingen?

Det er individuelt, hvornår den fulde effekt opnås.

Hvem kan ikke behandles?. Man må ikke tage Oxybutynin (Ditropan), hvis man har:

- Grøn stær, Urinretention, Alvorlige mave-tarmsygdomme (paralyse, colitis ulcerosa), Myastenia gravis, Blødningsbetinget hjertesygdom.

Bivirkninger

Almindelige bivirkninger inkluderer:

- Svimmelhed, Mundtørhed, Tørre øjne, Kvalme og opkast.

Tørre øjne kan være et problem, hvis du bruger kontaktlinser. Det kan derfor være en god ide, at du i en periode skal bruge briller. Viskøse øjendråber kan også hjælpe. Kontakt hudlægen, hvis du får bivirkninger.

Graviditet og amning

Du skal stoppe behandling med Oxybutynin (Ditropan), hvis du planlægger at blive gravid. Man ved ikke ved nok om, hvordan medicinen påvirker det ufødte barn. Oxybutynin (Ditropan) udskilles i modermælken. Derfor må Oxybutynin (Ditropan) ikke må tages, når du ammer.

Tandlægekontrol

På grund af mundtørhed og nedsat spyttproduktion anbefaler vi regelmæssig tandlægekontrol.